

Labret ,Monroe, Medusa

Abheilzeit : ca. 4-8 Wochen

Pflegeanleitung :

3x täglich – MORGENS – MITTAGS –ABENDS für 2 Wochen

1. Hände gründlich mit Seife waschen .

Nicht gewaschene Hände sind Gefahrenquelle Nummer Eins für dein frisches Piercing

2. Dein Piercing von außen mit Prontolind/Octenisept einsprühen und ca.1 Minute einwirken lassen .

Eventuelle Verkrustungen werden so angelöst, damit du sie im dritten Schritt leichter entfernen kannst .

3. Das Piercing von innen mit der Zunge etwas nach außen drücken. Eventuelle Verkrustungen die sich am vorderen Stichkanal und am Stab befinden vorsichtig mit einem frischen Wattestäbchen entfernen .

Jede unnötige Reizung des Stichkanals durch häufiges Bewegen des Stabes oder durch Verkrustungen die sich am Stab befinden sollten vermieden werden, da sie die Heilung des Stichkanals hinauszögern , deshalb gilt , weniger ist mehr .

4. Nachdem der Stab frei von Verkrustungen ist drück ihn noch einmal mit der Zunge etwas heraus und sprüh den Stab noch einmal mit Prontolind/Octenisept ein und lass ihn in die Lippe zurückgleiten . Das Mittel das jetzt am Stab ist verteilt sich so von selber gleichmäßig im Stichkanal .



79618 Rheinfelden
Zähringerstrasse 16
Tel. +49(0)7623-71 8900

79539 Lörrach
Untere Wallbrunnstr. 8
Tel. +49(0)7621-1631 200

moskitopiercing@hotmail.com

Was ist normal :

Die durch das Piercing verletzte Körperstelle bildet in der Wunde Fresszellen (Phagozyten).

Diese körpereigenen Zellen vernichten die eingedrungenen Mikroorganismen . Die dadurch entstandenen Zellabfälle sind als Eiter bekannt und treten als Abfallprodukt aus der Wunde (Phagozytose) aus . Das KANN vorkommen , MUSS aber nicht . Dieser Vorgang wird vom Körper solange fortgeführt bis alle Bakterien vernichtet sind und die Haut um den Stichkanal sich neu gebildet hat . Das ist aber alles noch kein Grund zur Sorge , denn obwohl der Stichkanal ein Sekret absondert ist es noch keine Entzündung . Auch sind kleiner Nachblutungen völlig normal und stellen keine Problem dar, solange sie nicht dauerhaft sind .

Eine Schwellung der Lippe ist auch völlig normal wird sogar von uns bei der Wahl des Erstschmucks einkalkuliert und kann mit Kühlung der betroffenen Stelle gut behandelt werden .

Leichte Schmerzen sind auch normal , immerhin ist ein Piercing eine Wunde .

Was ist nicht normal :

Ist die Schwellung der Lippe stark und bleibt über einige Tage trotz regelmäßiger Kühlung bestehen komme bitte im Studio vorbei und lass dir zur Entlastung deiner Lippe eventuell einen längeren Stab einsetzen . Sollten die Absonderungen aus dem Stichkanal massiv zunehmen oder einen stark fauligen Geruch annehmen schaue bitte sofort bei uns im Studio vorbei . Verfärbungen in den grünlichen, bräunlichen Bereich deuten auf eine stärkere Entzündung hin und du solltest auch sofort zu uns ins Studio kommen .

Was sollte vermieden werden :

Übermäßiger Konsum von Schmerzmitteln da dies zur Verdünnung des Blutes führt.

Stark blutverdünnende Medikamente, Blutdruck steigernde Medikamente und Medikamente die das Immunsystem und/oder den Kreislauf schwächen, sollten auch vermieden werden . Auch Alkohol hat eine blutverdünnende Wirkung und sollte in der ersten Woche nur in Maßen konsumiert werden .

Auf Nikotin sollte 2 Stunden komplett verzichtet werden und danach während der Abheilzeit so wenig wie möglich .